



# 24ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza



<b>Período</b>	<b>04 de abril a 03 de junho</b>					
<b>Objetivo</b>	<b>Reduzir as complicações, as internações e a mortalidade</b> decorrentes das infecções pelo vírus da influenza, na população alvo para a vacinação.					
<b>Meta</b>	<b>Vacinar, pelo menos, 90% de cada um dos grupos prioritários</b> para vacinação contra influenza.					
	<b>Laboratório produtor</b>	<b>Indicação</b>	<b>Apresentação</b>	<b>Via de administração</b>	<b>Cuidados específicos para a administração da vacina</b>	<b>Conservação e utilização após a reconstituição</b>
<b>Especificações da vacina</b>	Instituto Butantan	Imunização ativa contra a influenza causada pelos tipos A e B de vírus influenza.	Frasco - ampola com 10 doses de 0,5 mL	Intramuscular ou subcutânea profunda	Crianças menores de 6 meses de idade. Pessoas com história de anafilaxia grave a doses anteriores.	7 (sete) dias desde que mantidas as condições assépticas e temperatura entre +2°C e +8°C.
<b>Administração simultânea</b>	A vacina influenza <b>pode ser administrada na mesma ocasião de outras vacinas do Calendário Nacional de Vacinação.</b>					

## Esquema vacinal para influenza por idade

<b>Idade</b>	<b>Número de doses</b>	<b>Volume por dose</b>	<b>Observações</b>
Crianças de 6 meses a 2 anos de idade	2 doses	0,25 mL	Intervalo mínimo de 4 semanas. Operacionalmente 30 dias após receber a 1ª dose. *
Crianças de 3 a 8 anos de idade	2 doses	0,5 mL	Intervalo mínimo de 4 semanas. Operacionalmente 30 dias após receber a 1ª dose. *
Pessoas a partir de 9 anos de idade	Dose única	0,5 mL	-

\*Deverão ser aplicadas duas doses para crianças vacinadas pela primeira vez.

**NOTIFICAR TODOS OS EVENTOS ADVERSOS PÓS-VACINA!!**